

SCALA 1 : 5.000



REGIONE ABRUZZO
PROVINCIA CHIETI

ORTONA- SAN VITO CHIETINO-ROCCA SAN GIOVANNI-FOSSACESIA-TORINO DI SANGRO-CASALBORDINO-VASTO

REGIONE ABRUZZO PAR FAS - FAS 2007-2013 Obiettivo Specifico IV.2 - Obiettivo Operativo IV.2.2 - Linea di Azione IV.2.2.a Bando di Gara a Procedura aperta Direttiva 2004/18/CE. Lavori per la realizzazione della via Verde della Costa dei Trabocchi del Comune di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni,Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto.

CUP D91B1300049002 CIG 63262781C2

PROGETTO ESECUTIVO

COD.	DESCRIZIONE	SCALA	DATA
E.3.I	CARTA GEOMORFOLOGICA	1 : 5.000	APRILE 2017

PROGETTISTI INCARICATI:

Arch. BANDINI PAOLO (Mandatario)
Ing. FARINA LUIGI
Ing. PIETROMARTIRE LORENZO
Geol. CAVALLUCCI SILVIO
Ing. TUCCI ALESSANDRO-GEINA SRL
Arch. BOMBA CRISTIAN
Geom. D'AMBROSIO ORAZIO
Arch. ZAVARELLA ANTONIO
Ing. GALANO ALESSANDRO

IMPRESE CONCORRENTI:

CO.GE.PRI. SRL (Mandataria)
DI PERSIO COSTRUZIONI SRL
TENAGLIA SRL
STRADE E AMBIENTE SRL
EUROIMPIANTI SRL

Il responsabile del procedimento: Arch. Valerio A. Ursini

FORME STRUTTURALI	ORLO DI SCARPATA AD INFLUENZA STRATIGRAFICO-STRUTTURALE	

		STATO DI ATTIVITA'		
		ATTIVO	QUIESCENTE	NON ATTIVO
FORME, PROCESSI E DEPOSITI GRAVITATIVI DI VERSANTE	ORLO DI SCARPATA DI FRANA			
	VERSANTE INTERESSATO DA DEFORMAZIONI SUPERFICIALI LENTE			
	CORPO DI FRANA PER SCORRIMENTO TRASLATIVO			
	CORPO DI FRANA PER SCORRIMENTO ROTAZIONALE			
	CORPO DI FRANA PER COLAMENTO			
	FRANA DI PICCOLE DIMENSIONI			
FORME, PROCESSI E DEPOSITI FLUVIALI PER ACQUE CORRENTI SUPERFICIALI	ORLO DI SCARPATA DI EROSIONE FLUVIALE O TORRENTIZIA			
	ALVEO IN EROSIONE LATERALE O SPONDA IN EROSIONE			
	ALVEO CON TENDENZA ALL'APPROFONDIMENTO			
	SOLCO DI RUSCELLAMENTO CONCENTRATO			
	CONOIDE ALLUVIONALE			
	ORLO DI TERRAZZO FLUVIALE			
	VALLE A FONDO PIATTO			
FORME E PROCESSI MARINO-COSTIERI	ORLO DI SCARPATA DI EROSIONE MARINA			
	LINEA DI ARENILE IN AVANZAMENTO			
	LINEA DI ARENILE IN ARRETRAMENTO			
	PICCOLA FRANA SULLA LINEA DI COSTA			
	LIMITE INFERIORE DI FRANA SOMMERSO			

DEPOSITI QUATERNARI	COLTRI DETRITICHE ELUVIO-COLLUVIALI		depositi costituiti da materiali a granulometria mista, limoso-argilloso-sabbiosa, con inclusi clasti eterometrici angolosi, selciferi e calcarei, di colore da giallastro-avano a bruno, talora con chiazze e bande giallo-ocraceo. Sono spesso presenti lenti, noduli e veli di concrezione calcarea
	COLTRI ELUVIO-COLLUVIALI GHIAIOSE		materiali a granulometria prevalentemente ghiaiosa in pieca matrice sabbioso-siltosa: le ghiaie sono poligenniche, da subangolose a ben arrotondate, eterometriche.
	DEPOSITI ALLUVIONALI DI FONDOVALLE		sabbie e ghiaie con livelli a lenti di argilli e torbe; cerefiscazione per le più lenticolare e incoiscula, con livelli interdigitacati. Le ghiaie, poligenniche, hanno un range dal centimetro al decimetro, da subangolose ad arrotondate. Intercalazioni di sabbie grossolane e ghiaie. Presenza di strutture sedimentare lineari quali triangoli e base da concavo a molto largo. Le sabbie sono interdigitacati con arcuosità marmi di alta energia.
	DEPOSITI ALLUVIONALI TERRAZZATI		conglomerati poligenici, eterometrici, a strati da sottili a molto spessi disposti ad assetto da pianare ad inclinati, alternati a sabbie grossolane in lenti e strati da medi a molto spessi. Ciottoli da subangolosi a ben arrotondati, con dimensioni molto variabili e i clasti si presentano da subangolosi ad arrotondati. Presenza di strutture sedimentare linear quali triangoli e base da concavo a molto larga. La facies conglomeratica è costituita da una serie di canali anastomizzati basa e molto larga. Il fluviale verso sud. La base della formazione è contraddistinta da un contatto di tipo erosivo costituito da una serie di canali anastomizzati basa e molto larga. Presenza al tetto di lente e veli di paleosuoli colluviali, decarbonati e talora argillificati.
	DEPOSITI LITORANEI		sabbie sciolte medio-fini, poligeniche, e ghiaie eterometriche con clasti generalmente discoidali, da arrotondati a subarrotondati
	DEPOSITI ANTROPICI		materiali castici ad eterometrici costituiti da tutte le frazioni granulometriche con ingloba frammenti eterometrici di manufatti e resti di laterizi
FORME ANTROPICHE	SCOGLIERE PARAONDE		
	ARGINI FLUVIALI		
	RILEVATO		